

العدوى الشائعة التي تدمر الأرواح CMV

الفيروس المضخم للخلايا (CMV) الخلقى هو فيروس شائع قد يضع حياة الأطفال الذين لم يولدوا بعد في خطر

CMV أو الفيروس المضخم للخلايا

(si-to-MEG-alo-vi-rus)

هو فيروس شائع يمكن أن يصيب أي شخص

يتضرر من **طفلين**
إلى **ثلاثة** أطفال
كل يوم
بسبب الفيروس المضخم للخلايا



أي ما يقرب من
1000 طفل كل عام
في المملكة المتحدة

لن يدرك معظم الأشخاص حتى أنهم مصابون بالفيروس المضخم للخلايا، ولكن إذا أصيبت به المرأة الحامل، فيمكن أن تنقله إلى جنينها مما يسفر عن نتائج مأساوية

اكتُشف الفيروس المضخم للخلايا في الخمسينيات لكن لا يوجد لقاح ضده حتى الآن

اكتشف الفيروس المضخم للخلايا فريق البحث نفسه الذي اكتشف شلل الأطفال والتكاف والحصبة الألمانية



1956

نُشر أول بحث حول لقاح مضاد للفيروس المضخم للخلايا



1984

ورد في تقرير مفصل في الولايات المتحدة الأمريكية أن اللقاح المضاد للفيروس المضخم للخلايا سيكون فعالاً للغاية من حيث التكلفة



2000

ظهرت نتائج واعدة لتعويض مختلفين من اللقاح المضاد للفيروس المضخم للخلايا



-2009

2012

يوجد لقاحات ضد شلل الأطفال والحصبة والتكاف والحصبة الألمانية ولكن لم يتم التوصل بعد للقاح مضاد للفيروس المضخم للخلايا



الوقت الحالي

هل يمكننا التوصل للقاح يقضي على الفيروس المضخم للخلايا قبل أن يبلغ 65؟



2021



ينتشر الفيروس المضخم للخلايا عبر سوائل الجسم، وخاصة عند الأطفال الصغار

ينتشر الفيروس المضخم للخلايا من خلال سوائل الجسم وفرصة الإصابة من الاتصال العرضي ضئيلة للغاية



يصاب الكثير من الأطفال الصغار بالفيروس المضخم للخلايا، وخاصة أولئك الذين يذهبون إلى دور الحضانة. تحتاج النساء اللواتي يتعاملن مع الأطفال أو لديهن أسرة بالفعل إلى توخي الحذر بشكل خاص أثناء الحمل




حوالي ثلث النساء المصابات بالفيروس المضخم للخلايا للمرة الأولى أثناء الحمل ينقلن الفيروس إلى أجنهن



تصاب النساء بالفيروس المضخم للخلايا بشكل رئيسي من لعب الأطفال الصغار وبولهم

الفيروس المضخم للخلايا هو السبب الرئيسي للعيوب الخلقية في المملكة المتحدة

النسبة المئوية للنساء في المملكة المتحدة (تتراوح أعمارهن بين 18 و44) المصابات بـ



الفيروس المضخم للخلايا

إنه أكثر شيوعًا من داء المقوسات (براز القطط) أو داء الليستريات (الجبن الأزرق) بأكثر من 30 مرة، ومع ذلك فقد أصيب به عددًا أقل بكثير من النساء مقارنة بهذه الحالات

أجرت ComRes مقابلات مع 1,008 سيدة بريطانية تتراوح أعمارهن بين 18 و44 عامًا عبر الإنترنت ما بين 28 و30 مارس عام 2014. تتوفر جداول البيانات الكاملة على موقع ComRes الإلكتروني: www.comres.co.uk

ما يقرب من 1000 مولود كل عام (واحد من كل 1000)

متلازمة داون 750 مولود كل عام (واحد من كل 1000)

داء المقوسات 25 مولود كل عام

داء الليستريات 30 مولود كل عام



الفيروس المضخم للخلايا هو السبب الرئيسي - الذي يمكن الوقاية منه - لفقدان السمع عند الأطفال

أنواع الإعاقات:



كل 5 من 1000 يموت 5 من كل 1000 مولود مصاب بالفيروس المضخم للخلايا أثناء الولادة أو في غضون عامه الأول في الحياة



عدوى الفيروس المضخم للخلايا مسؤولة عن 25% تقريبًا من حالات فقدان السمع في مرحلة الطفولة

يمكن أيضًا أن يسبب الفيروس المضخم للخلايا الإجهاض أو الإجهاض عند النساء الحوامل

يموت 5 من كل 1000 مولود مصاب بالفيروس المضخم للخلايا أثناء الولادة أو في غضون عامه الأول في الحياة

تشمل الإعاقات الأخرى:



اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، صعوبات في التعلم والتصرف



فقدان البصر



الإعاقة الجسدية



الشلل الدماغي، الصرع

يمكن تقليل خطر الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا من خلال اتخاذ احتياطات النظافة البسيطة

من الصعب تجنب كل تعرّض ولكن إجراء بعض التغييرات حيثما أمكن من شأنه المساعدة في حماية طفلك

اغسلي بعناية

اغسلي يديك وأي أشياء تتلامس مع سوائل الجسم بالماء والصابون، على سبيل المثال، بعد الرضاعة وتنظيف الأنف وتغيير الحفاض




لا تشاركي

تجنبي مشاركة الطعام أو الشراب أو أدوات المائدة أو اللهايات مع أي شخص



يتم القضاء على الفيروس المضخم للخلايا بالماء والصابون



تجنبي تقبيل الطفل على الفم، قبله على الرأس أو أعطه عنقاً كبيراً

CMV  **Action**
EDUCATE • VACCINATE • ERADICATE